

- Фетисов С.А. 2016. Зимовка лебедя-кликун *Cygnus cygnus* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1268): 1119-1127.
- Фетисов С.А. 2018. Водно-болотные птицы в районе российской стороны Псковско-Чудского водоёма и рамсарском угодье «Псковско-Чудская приозёрная низменность». Материалы для оценки современного состояния видов, разработки системы их мониторинга и мероприятий по сохранению природных комплексов. Себеж: 1-710. (Тр. нац. парка «Себежский». Вып. 6).
- Фетисов С.А., Волков С.М. 2010. О зимовках водоплавающих и околоводных птиц в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **19** (560): 560-573.
- Фетисов С.А., Головань В.И., Ильинский И.В. 2002. Территориальные связи птиц Псковско-Чудского озера и приозёрной низменности по данным мечения и возвратов колец в Псковской области // *РиО + 10: охрана окружающей среды, природопользование, образование. Материалы Псков. обл. экол. конф.* Великие Луки, 7: 122-129.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1897: 1102-1106

Фенологические наблюдения над теньковкой *Phylloscopus collybita* в окрестностях деревни Дубровы Новоржевского района Псковской области

Э.В. Григорьев

Эдуард Вячеславович Григорьев. Деревня Дубровы, Новоржевский район, Псковская область, 182457, Россия. E-mail: edik.grigoriev2016@yandex.ru

Поступила в редакцию 10 января 2020

Пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita* – обычный пролётный и гнездящийся вид Псковской области (Бардин, Фетисов 2019).

Результаты моих многолетних (1987, 1988, 1991, 1992, 1994-2019) наблюдений за теньковкой в окрестностях деревни Дубровы Новоржевского района Псковской области представлены в таблице.

Самая ранняя регистрация первой песни теньковки – 28 марта 2014, самая поздняя – 30 апреля 1987, средняя за 29 лет – 14 апреля. Для сравнения укажем, что средняя дата регистрации песни веснички *Phylloscopus trochilus* в этом же районе за эти же годы – 23 апреля (Григорьев 2020). В Себежском районе в 1984-1989 годах прилёт теньковок начинался в интервале от 12 апреля (1984) до 28 апреля (1987), в 1998 году прилёт был отмечен лишь 5 мая (Фетисов и др. 2002). В окрестностях деревни Дубровы в 1987 году первая песня теньковки отмечена 30 апреля, а в 1998 году – 13 апреля. Массовое пение в среднем за 22 года начиналось через 4 дня после регистрации первой песни – 18 апреля (самая ранняя дата 9 апреля 2010, самая поздняя – 28

апреля 1997 и 2003). Во второй половине июля самцы теньковки почти прекращают пение на период линьки, но затем, уже осенью, вновь начинают петь. Осеннее пение продолжается практически до отлёта. Последняя песня отмечалась от 18 сентября в 2019 году до 14 октября в 2001 году, в среднем за 26 лет – до 1 октября.

Самая поздняя осенняя встреча с теньковкой произошла 28 октября 2000 у деревни Тишково на берегу реки Вёржа: птичка спокойно ловила мелких насекомых среди ивняка. До конца октября теньковки могут задерживаться и севернее, в Ленинградской области. А тёплой осенью 2017 года в одном из парков Санкт-Петербурга теньковка была встречена даже 27 ноября, причём птица несколько раз пела (Бардин 2017).

Фенологические наблюдения над теньковкой *Phylloscopus collybita*
в окрестностях деревни Дубровы Новоржевского района Псковской области

Годы	Первая песня	Начало массового пения	Последняя песня	Начало кладки в самом раннем гнезде	Начало кладки в самом позднем гнезде
1987	30 апреля	–	6 октября	–	–
1988	8 апреля	–	–	–	–
1991	22 апреля	–	–	–	–
1992	16 апреля	–	–	–	–
1994	12 апреля	–	30 сентября	23 мая	–
1995	19 апреля	–	4 октября	8 мая	16 июня
1996	17 апреля	–	6 октября	22 мая	–
1997	28 апреля	28 апреля	7 октября	23 мая	–
1998	13 апреля	15 апреля	4 октября	5 мая	–
1999	16 апреля	16 апреля	12 октября	18 мая	19 июня
2000	12 апреля	18 апреля	9 октября	9 мая	–
2001	6 апреля	18 апреля	14 октября	6 мая	–
2002	15 апреля	18 апреля	13 октября	13 мая	–
2003	20 апреля	28 апреля	5 октября	–	–
2004	9 апреля	16 апреля	5 октября	14 мая	–
2005	11 апреля	15 апреля	12 октября	17 мая	–
2006	16 апреля	20 апреля	–	–	15 июня
2007	–	–	30 сентября	25 мая	26 июня
2008	4 апреля	11 апреля	25 сентября	26 мая	–
2009	12 апреля	21 апреля	3 октября	17 мая	11 июня
2010	1 апреля	9 апреля	9 октября	13 мая	–
2011	15 апреля	21 апреля	27 сентября	23 мая	17 июня
2012	13 апреля	16 апреля	5 октября	7 мая	12 июня
2013	17 апреля	20 апреля	1 октября	15 мая	–
2014	28 марта	15 апреля	10 октября	16 мая	–
2015	21 апреля	26 апреля	4 октября	17 мая	–
2016	6 апреля	12 апреля	11 октября	6 мая	9 июля
2017	11 апреля	27 апреля	7 октября	17 мая	23 июня
2018	7 апреля	13 апреля	26 сентября	11 мая	–
2019	17 апреля	22 апреля	18 сентября	13 мая	29 июня



Рис. 1. Самка теньковки *Phylloscopus collybita* в гнезде. Опушка приручьевого ольшаника. Окрестности деревни Дубровы. 21 мая 2000. Фото автора.



Рис. 2. Гнёзда теньковки *Phylloscopus collybita*. Слева – на поросли серой ольхи в приручьевом ольшанике, окрестности деревни Дубровы, 11 июля 2017. Справа – среди травы на ветках упавшего дерева на высоте 0.63 м, окрестности деревни Михеево, 3 июня 2018. Фото автора.



Рис. 3. Кладки теньковки *Phylloscopus collybita*. Слева – гнездо в гирлянде хмеля на серой ольхе, окрестности деревни Семёнкино, 8 июля 2017. Справа – гнездо среди травы на ветках упавшего дерева на высоте 0.63 м, окрестности деревни Михеево, 3 июня 2018. Фото автора.

Гнездовые места теньковки весьма разнообразны. По сравнению с весничкой, теньковка – чисто лесная птица. Она предпочитает опушки лиственных и смешанных лесов, окраины заброшенных садов и осоково-кочкарниковые берега лесных озёр. Гнездо представляет собой небольшой шар из сухой травы, лежащий на земле или на кустах или жёстких стеблях травы, обычно невысоко над землёй – от 0 до 0.63 м, в среднем – 0.28 м ($n = 13$). Нередко строит гнёзда на поросли ольхи и подросте ели. Вход боковой, выстилка – из перьев лесных птиц, чаще всего – перьев рябчика *Tetrastes bonasia*. В кладке обычно 5-6 яиц. Средняя величина кладки 5.8 яиц ($n = 14$). Их окраска белая (свежие на просвет выглядят розоватыми) с мелкими редкими коричневыми и чёрными пятнами и точками. Самые ранние даты начало кладок – 5 мая 1998 и 6 мая 2001 и 2016. В среднем за 24 года первые яйца были отложены 15 мая. Как известно, для теньковки характерны две кладки за один гнездовой сезон (Лапшин 2000). В окрестностях деревни Дубровы самая поздняя кладка начата 9 июля 2016. В Себежском районе самые поздние кладки теньковки находили в начале третьей декады июля (Фетисов и др. 2002). В среднем за 10 лет наблюдений вторые или повторные кладки появлялись 21 июня – через 5 недель (37 дней) после начала первых кладок.

Литература

- Бардин А.В. 2017. Необычно поздняя встреча теньковки *Phylloscopus collybita* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1537): 5231.
- Бардин А.В., Фетисов С.А. 2019. Птицы Псковской области: аннотированный список видов // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1733): 731-789.
- Григорьев Э.В. 2020. Фенологические наблюдения над весничкой *Phylloscopus trochilus* в окрестностях деревни Дубровы Новоржевского района Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1885): 601-604.

Лапшин Н.В. 2000. Биология теньковки *Phylloscopus collybita* в Карелии // Рус. орнитол. журн. 9 (90): 3-27.

Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2002. Птицы Себежского Поозерья и национального парка «Себежский». СПб, 2: 1-127.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1897: 1106-1113

Орнитологические наблюдения в окрестностях Семипалатинска весной 1957 года

С.Г.Панченко

Из архива Института зоологии МОН РК*

В течение зимы 1956/57 года орнитофауна города Семипалатинска была представлена в основном домовыми воробьями *Passer domesticus*, большими синицами *Parus major*, сороками *Pica pica* и серыми воронами *Corvus cornix*. Больших синиц всю зиму видел очень много, и они были самыми обыкновенными и даже многочисленными птицами на городских улицах, в садах и скверах.



Одна из улиц Семипалатинска ранней весной. 1950-е годы.
Фото из архива краеведа М.И.Ситуды.

В пойменных урёмах Иртыша и на Полковничьем острове всю зиму встречались обыкновенные чечётки *Acanthis flammea*, державшиеся стайками по 30-50 особей в бурьянниках и кустарниках. Единично они появлялись и в городских садах и на пустырях. Единичными в урёме всю зиму наблюдались урагусы *Uragus sibiricus*, пухляки *Parus montanus* и белые лазоревки *Parus cyaneus*. Только один раз за 6 экскурсий

* Подготовил к печати Н.Н.Березовиков.